

Nº 02

FRUTIKULTURE

Fishe teknike- krasitja e gjelber

Kur behet krasitja e gjelber?

- Kur pema ka shperthime te medha dhe pemetari futet ne rrethin vicioz me pemen "pre dhe shperthe".
- Kur duam te bejme formimin e kurores se pemes

Ku aplikohet

- Aplikohet tek molla, dardha, kumbulla, qershia etj.
- Perdoret ne pemetoret intensive dhe ekstensive


Koha e kryerjes

- Eshte 15 Qershori-15 Korrik (kur lastari ka arrit drunjezim e plote ne baze) ne varesi te zonave te ndryshme klimatike, por vazhdon deri pas vjeljes se frutit sipas gjendjes se pemes dhe vendimit te krasitesit.
- Tek molla fillon kur gjatesia e lastarit ka arritur ne 14 –16 gjethes.

Teknika e krasitjes:

Zbatohen te njejtat parime si ne krasitjen dimerore:

- Hiqen deget llupese ose thithaket
- Heqen e deget me kend te ngushte dhe drejtim vertikal,
- Nuk pincohen majat e degeve
- Lihen deget me kend normal (te gjere) qe sherbejne per formim kurore dhe prodhimin e ardheshem
- Prerja e lastarit behet **me dy sytha ose ne pjesen unazore te bazes se lastarit.**



Efekti

- Eleminon deget e teperta (thithaket)
- Kufizon shperthimet e reja
- Ekuilibro te pemes-rritje prodhim
- Shendeteson pemen dhe perballon nevojat fiziologjike:
 - o veteushqimin, rritjen e frutave dhe pergatitjen per prodhimin e ardheshem
- Dritezohet dhe ajroset me mire pema
- Lehteson sherbimet ne peme te trajtimet dhe vjeljen
- Thjeshteson shume krasitjen dimerore.

Rendesia ekonomike

- Rritet rendimenti dhe marrim prodhim te perviteshem
- Rritet cilesia e frutave
- Ulje e kostos se prodhimit

Kujdes!

- Per varietetet qe kane rritje te fuqishme (Gala, Fuji) nuk duhet te behen prerje te medha sepse jepin shume shperthime, por duhet te behet perkulja e degeve.
- Lastaret qe mbrojne frutat nga djegia dielllore hiqen ne vjeshte ose pas vjeljes

