

FRUTIKULTURE: FISHE TEKNIKE

NDJEKJA E NJE PEMETOREJE ME AKS

N°01

Adad Malore:
Tel: +355682066485

info@adadmalore.al,
www.adadmalore.al

Sepecialist:

Dr. Hafuz DOMI

domihafuz@yahoo.com

Elementet baze per tu zbatuar ne pemetoret

Zgjedhja e parceles :

Uji : I disponueshem, ne masen e duhur dhe jo me shume

Karakteristika fizike : nese tokat jane te renda te behet mbjellja me mbushje (ne tokat argjilore)

Karakteristika kimike: te korrighohen deficitet eventuale (nje analize toke cdo 5 - 7 vjet)

Zgjedhja e varietetit dhe e nensharteses :

	106/111	PI 80	Pajam
<u>Varietete te reja</u>			
Pink Lady, Rosy Glow ⁽³⁾		● ⁽¹⁾	● ⁽²⁾
Breaburn		● ⁽¹⁾	● ⁽²⁾
Fuji		● ⁽¹⁾	● ⁽²⁾
Gala, Galaxie, Broochfield,		● ⁽¹⁾	● ⁽²⁾
Canada Grise		● ⁽¹⁾	● ⁽²⁾
Chantecler, Belchard		● ⁽¹⁾	● ⁽²⁾
<u>Varietete te vjetra</u> ⁽⁴⁾			
Golden		● ⁽¹⁾	● ⁽²⁾
Rouges américaines	● ⁽¹⁾	● ⁽²⁾	
Granny		● ⁽¹⁾	● ⁽²⁾

(1) toka te varfra (2) toka te pasura (3) kujdes, varietet me pjekje te vonë (te behet nje test para se te mbillet ne sip. mbi 400m

(4) Te mos harrohet rifutja dhe ruajtja e varieteteve tipike shqiptare

Polinizimi :

5 deri ne 10 % e pemeve (psh : Granny Smith)

Densiteti :

	106/111	PI 80	Pajam
<u>Distanca e mbjelljes</u> (ne funksion te mekanizimit)	5/1,5	4,5/1,5	3,5/1,3 Ou 4/1

Mbjellja :

Pika e shartimit nga 15 deri ne + 15 cmmbi nivelin e tokes

Pika e shartimit ne kahe te kundert te eres

Gropa e mbjelljes : 0,20m/0,20m/0,20m

Mbeshtetja:

Para mbjelljes

1 piket cdo 7 peme : thellesia 0,50 m, lartesia 3,00 m (lartesia totale 3,5 m)

Lartesia ne 3 deri 4 tela : ● 0,70m-0,80m ● 1,50m-1,60m ● 2,30m-2,40m
● 3,00m

Krasitja per formen e kurores dhe mirembajtjen :

Gjate 4 deri 5 vjet, te hiqen vetem kendet me te < 90°

Nga ky stad e ne vazhdim : hiqen deget e teperta ose mbi numrin e duhur dhe te gjitha degezat (>20cm)

	<u>Pleherimi:</u> N : 50 ne 60 njesi ne 3 here (vjeshte 15, grope 25, pjesa tjeter ne Qershor) P : 80 njesi (ne vjeshte) K : 50 njesi (ne vjeshte) + korrigjimet me mikroelement <u>Ujitja:</u> Ujitje me pika ose me mikro-aspersor <u>Hegja e barit :</u> Vetem prane trugut te pemes (1/4 ne 1/3 te siperfaqes) : Per peme me te < 4 vjec : Gramoxone, Cent 7, Surflan, ... Per pemet me te > 4 vjec: Glyphosate, Basta, Gol, Prowl, ... <u>Lufta kunder kromes :</u> Trajtime sistematike cdo 7 dite dhe pas rreshjeve ne 25 mm ribehet trajtimi, trajtimet qe nga stadi C-C3 deri ne stadin «rrezimi qershorit te frutave » (mund te perkoje me 15 qershorin nese nuk ka me krome) Te alernohet: Prodhim kontakti (prodhime kontakti) : captane, mancozèbe, thirame, dogadine, méthyleuparène, ... Prodhim sistemik (prodhime sistematike: IBS, Strobilurine, Chorus, <u>Lufta kunder karpokapsit (krimbi i molles) :</u> Trajtimi I pare ne stadin e frutave me te > 15 mm + capture (perpara pikimit), Pastaj cdo 15 dite me organophosphorés ose pyrethinoïdes (te ribehet trajtimi pas shiut me > 25 mm) <u>Lufta kunder afideve (morr i murme):</u> Te arsyetohet ne funksion te stadi C3-D : huile (vaj) + pyrethinoïde Stadi E2 : Enduro Pas luleve (stadi H) : Suprème <u>Rrallimi:</u> Me dore: lihet nga nje molle pas cdo pellembe (praktike) Kimike : ne funksion te ngarkeses dhe fuqise : Rodofix + Rosenox, Sevin, Amethine, Brevis (shih tabelen) <u>Konservim (rruajtje):</u> Duke filluar nga 15 qershori deri ne nje jave para vjeljes : Captane, ose méthyleuparène, ose Pantor (per trajtimin e fundit) cdo tre jave. <u>Krasitja e gjelber :</u> Hegja e degezave llupese qe nga stadi « rrezimit te qershorit » me qellim qe te shtojme kolorimin e frutave dhe te pergjysmojme punen per krasitjen dimerore <u>Vjelja :</u> Test maturimi : Jode ose penetrometer Kolorimi per dy ngjyreshet Perqindja e sheqerit me refraktometer (11 deri 12) <u>Sperkatja :</u> 1000 litra per hektare <u>Trajtime vjeshte :</u> Nese ka kancer (Nectria galligena): leng bordolez Nese ka krome: 2 aplikime me perzierje: Ure (150 kg/ha) + leng bordolez (20 kg/ha)
--	--