

PROGRAMI I TRAJTIMIT TË KUMBULLËS

PËRDËRMI I KËTJË PROGRAMI SIGURON:
Shëndetësimin e pemës
Fruta cilësor dhe pa mbetje kimike
Prodhim të lartë dhe të përvitshëm



KULTIVIMI KUMBULLËS ME FORME KURORË AKS

PËRPARËSIA:

- Mbillet në distanca 4 x 4 ose 5 x 4 m (500-640 pemë/ha)
- Forma e kurorës është me bosht qendror mbi të cilin dalin degët anësore
- Futet në prodhim që në vitin e II-të
- Lehtësohen shërbimet e krasitjes, trajtimet kimike dhe vjeljes
- Rritet rendimenti dhe cilësia e prodhimit
- Kjo formë aplikohet dhe me fidanë me nenshartesa vegjetative apo me origjinë nga fara.
- Mbjelljet e reja të bëhen me formë Aks.
- Të përmirësojmë kurorat aktuale të pemëve me anë të krasitjeve dimërore dhe të gjelbër me elementë teknik të formës aks

Kontakt: 0682066485
info@adadmalore.al
www.adadmalore.al



KALENDARI I TRAJTIMIT TË KUMBULLËS

STADI FENOLOGJIK



STADI FENOLOGJIK	SEPMUNDIMET	PRODUKTE TREGUARË / LENDA AKTIVE	BARËNCA DITE	Dosja PC/ha	Dosja MSH/ha	Nr. pemë / ha	OBSERVIME
SHITAT NE DIME	BACTEROSE	BAKES : Long budbaze: ONAR® PLO BUDCOCK 75 WG DANCUS		0.250 kg 0.660 kg 0.3 L 0.167 kg			Ku janë vendosur shtundit në vit me punë duhet përdorur trajtues me produkte bakër
FRYJA E SYNET	Repastrat	Vajto në lëndë: OVERITE, ACACILL, OLSBAN, EUPHYTANE Gold, OVIWON Extra OVIWON plus		4 L 3.5 L			Trajto me vagonë të rëndësishme. Nuk duhet të bëhet spërkatje kur përdoret rigrat.
SHITAT NE DIME	Aphidat CALAPSYLL	PHYTHENOIDES : Laridë-cyhalothrine : KARATE 200g	7 ditë	0.011 L	0.11 L	2	Ku nuk janë dhënë efektin e duhur spërkatje me vagonë duhet të bëhet trajtues
20 % e butonizimit boshë STADI D-E 20 % e hapjes së luleve STADI F	KALBACI / LULET offe vjeljes	Cyprodinë + Fludoksini : SWITCH BPC Thiophanate metilil : TOPSIN 70 WG	7 d 14 d	0.020 kg 0.3 kg		3 1	Atëherë i përdoren trajtues me 2 trajtues
SHITAT NE DIME	NOFLOCAMPE (CENOS)	Laridë-cyhalothrine : KARATE 200g KARATE 200g		0.011 L 0.022 kg		2 2	
SHITAT NE DIME	APHIDET	Laridë-cyhalothrine : KARATE 200g KARATE 200g	7g 7g	0.011 L 0.022 kg	0.11 L 0.22 kg	2 2	Trajto i pastër dhe profilaktik për 2 rreth
SHITAT NE DIME	Natyshku	Captan NESTAN SC NESTAN 80 WG DELAN WG	21 d 21 d 21 d	0.3 L 0.19 kg 0.05 kg	3.5 1.9 kg	4-6 4-6	Captan mund të përdoret 4-6 herë për trajtues
SHITAT NE DIME	Repastrat	SQUIN : NECROTICUS SPECIAL Pyridabene : NESTAN WG		4 kg 0.020 kg	10 kg	10 1	Squror të shpesh kështu marrim trajtues kur bëhen 2 trajtues në 15 ditë dhe modifikuar. Boshitje për 7°C
MES PRILLI - MES MAJ	Vitërat Tërpa	Delicativit : DECO PROTECT Laridë-cyhalothrine : KARATE 200g CACTOPO		0.05 L - 0.085 L 0.0075 L - 0.011 L 0.025 L		2 3 2	CACTOPO: laridë dhe modifikuar
MAJ - QERSHOR	Mbështetje e luleve e gjetës trajtues / P	Fluconazole fungicid : DIFAME 40L Diflucan : DELAN WG		0.050 kg 0.050 kg	2 kg	4 2	Trajto i pastër fillet me trajtues dhe përdoret e reja. Rekomandohen ditë 2 trajtues në sezon.
	Repastrat	Pyridabene : NESTAN WG ENVIDOR		0.011 L 0.04 L		1 1	
Maj - mes shtetit	KOMBINIMET	Thiophanate metilil : CACTOPO	15 d	0.030 kg		2	
		Ipredione : BONVAL WG BONVAL AQUA FLO Cyprodinë + Fludoksini : SWITCH Pyrethrinoides + Insecticid : SQUIN	14 d 14 d 7 d 7 d	0.3 kg 0.35 L 0.08 kg 0.045 - 0.075 kg	1 kg 1.5 L	2 2 2 2	Ku i mbështetja bëhet në përputhje me Ploti pas 30 ditë duhet të bëhet spërkatje - Max 5 rreth
	KOMBINIMET	Delicativit : DECO PROTECT KARATE 200g CACTOPO		0.05 L - 0.085 L 0.0075 L - 0.011 L 0.025 L - 0.025		2 2 2	
Vjelja gjetës serioze të gjetësve	BACTEROSE	BAKES BAKES Long budbaze: BAKES BUDCOCK 75 WG		0.250 kg 0.167 kg			Trajto 2-3 trajtues nëse kultivat e lagësht apo nëse shkaktojnë, përdorin gjetës të rëndësishme të gjetësve